

393.8mm

15mm
176mm
8mm

配料表

生牛乳、乳糖、食用植物调和油（1、3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油）、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、脱盐乳清粉、二十二碳六烯酸油酸、核苷酸（氯化钾、磷酸钾、磷酸氢钙、氯化钠、硫酸镁、硫酸亚铁、磷酸钾、磷酸钾、硫酸铜、亚硝酸钠、磷酸钙）、花生四烯酸油酸、维生素（氯化胆碱、L-抗坏血酸、dl-α-磷酸生育酚、胆钙化醇、维生素E、维生素K、D-泛醇、D-生物素、维生素B12、核黄素、烟酰胺、泛酸、肌醇、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、维生素C、生物素、胆碱、左旋肉碱酒石酸盐、叶黄素。本产品含有乳成分。

保质期：24个月

生产日期及批号：见罐底部
产品标准号：GB 10765-2021
产品类型、属性：乳基粉状婴儿配方食品
检验合格证书同生产日期及批号

喂哺表

年龄	每次用量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉(平匙)	
0-2周	60	2	7-8
第3-4周	90	3	6-7
第2个月	120	4	5-6
第3个月	150	5	5-6
第4个月	180	6	5-6
第5-6个月	210	7	5

注：本喂哺表参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您也可根据宝宝自身情况酌情增减使用量。

☎ 咨询热线：4006038099
🌐 网址：www.sanyuanbaobao.com

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	千焦	100	2124
蛋白质	克	0.52	11.0
脂肪	克	1.28	27.2
碳水化合物	克	0.19	4.0
D-亚油酸	毫克	19	400
碳水化合物	克	2.5	53.2
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	17	360
维生素D	微克	0.80	12.7
维生素E	毫克(α-生育酚当量)	0.40	8.5
维生素K	微克	1.27	27
维生素B1	毫克	25	540
维生素B2	毫克	30	600
维生素B6	毫克	21.0	445
维生素B12	微克	0.094	2.0
烟酸(烟酰胺)	毫克	193	4100
叶酸	毫克	3.1	65
泛酸	毫克	165	3500
维生素C	毫克	2.9	60
生物素	微克	0.80	17
胆碱	毫克	6.1	130
矿物质			
钠	毫克	7	150
钾	毫克	18	382
钙	毫克	14.7	313
镁	毫克	1.4	30
铁	毫克	0.22	4.6
锌	毫克	0.18	3.9
锰	毫克	1.98	42
磷	毫克	15	320
碘	微克	9	200
硒	微克	4.5	96
铜	微克	16	350
钴	微克	0.80	17.0
可溶性成分			
牛磺酸	毫克	1.7	36
左旋肉碱	毫克	0.3	7.0
二十二碳六烯酸(DHA)	毫克	4.4	94.5
二十碳四烯酸(ARA)	毫克	4.9	105
膳食纤维			
低聚半乳糖	毫克	145	3080
多聚果糖	毫克	9	200
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	克	0.21	4.4
核苷酸	毫克	3.3	70
核苷酸	毫克	1.18	25
乳铁蛋白	毫克	2.4	50
酪蛋白磷酸肽	毫克	2.0	43

100毫升奶液=13克奶粉+90毫升水



爱力优 婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)



净含量:800克
注册号:国食注字 YP20170705

爱力优
婴儿配方奶粉
(0-6月龄,1段)



特别提示 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法 本产品应贮存于干燥凉爽处，用后及时封盖，以保持新鲜，防止受潮或异物进入。请在保质期内食用，开封后一个月内用完。

食用方法

调奶时请用本产品专用量匙，多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。未经煮沸消毒的水、饮奶器具或不适当的奶浓度均可能引起不适。每次只冲调一次用量的奶液，冲调好的奶液应尽快饮用，未喝完的奶液不宜留存。

- 准备喂哺前将双手洗净。
- 将奶瓶、奶嘴及奶嘴环盖彻底洗净，使用前用沸水煮不少于5分钟。
- 参照“喂哺表”，将正确份量的温开水(50℃-60℃)加入到消毒后的奶瓶。
- 参照“喂哺表”，用专用量匙加入正确数量的奶粉。
- 摇晃直至奶粉全部溶解，将奶滴于手臂上，确定已达到宝宝可饮用温度后，即可喂哺。

生产商：河北三元食品有限公司
地址：河北省石家庄市新华区三元路6号
产地：河北省石家庄市
生产许可证编号：SC10513018400046



扫一扫
获取了
更多
权益



307.4 mm

10mm

153.5mm

8mm

配料表

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1, 3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、脱盐乳清粉、二十二碳六烯酸油脂、矿物质(氯化钾、碳酸钙、磷酸氢钙、氯化钠、硫酸镁、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸锌、硫酸铜、亚硒酸钠、硫酸锰)、花生四烯酸油脂、维生素(氯化胆碱、L-抗坏血酸、d,l-α-酮酸生育醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、氰钴胺、叶酸、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇)、多聚果糖、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、核苷酸(5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、左旋肉碱源石酸盐、叶黄素。
本产品含有乳成分。

保质期: 24个月

生产日期及批号: 见罐底部

产品标准号: GB 10765-2021

产品类别、属性: 乳基粉状婴儿配方食品

检验合格证书号同生产日期及批号

喂哺表

年龄	每次用量		每天喂哺次数
	毫升量(毫升)	勺数(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
第3-4周	90	3	6-7
第2个月	120	4	5-6
第3个月	150	5	5-6
第4个月	180	6	5-6
第5-6个月	210	7	5

注: 本喂哺表参照正常发育婴儿的营养需求而设计, 您也可根据宝宝自身情况酌情增减使用量。

☎ 咨询热线: 4006038099

🌐 网址: www.sanyuanbaobao.com

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	千焦	100	2124
蛋白质	克	0.52	11.0
脂肪	克	1.28	27.2
亚油酸	克	0.19	4.0
α-亚麻酸	毫克	19	400
碳水化合物	克	2.5	53.2
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	17	360
维生素D	微克	0.60	12.7
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.40	8.5
维生素K	微克	1.27	27
维生素B ₁	微克	25	540
维生素B ₂	微克	38	800
维生素B ₆	微克	21.0	445
维生素B ₁₂	微克	0.094	2.0
烟酸(烟酰胺)	微克	193	4100
叶酸	微克	3.1	65
泛酸	微克	165	3500
维生素C	毫克	2.8	60
生物素	微克	0.80	17
胆碱	毫克	6.1	130
矿物质			
钠	毫克	7	150
钾	毫克	18	382
钙	毫克	14.7	313
铁	毫克	1.4	30
锌	毫克	0.22	4.6
铜	毫克	0.18	3.9
锰	毫克	1.98	42
硒	毫克	15	320
磷	毫克	9	200
碘	毫克	4.5	96
氯	毫克	16	350
钙	毫克	0.80	17.0
可溶性成分			
牛磺酸	毫克	1.7	36
左旋肉碱	毫克	0.3	7.0
二十二碳六烯酸(DHA)	毫克	4.4	94.5
二十碳四烯酸(ARA)	毫克	4.9	105
膳食纤维			
低聚半乳糖	毫克	145	3080
多聚果糖	毫克	9	200
1,3-二-β-D-吡喃半乳糖	克	0.21	4.4
叶黄素	微克	3.9	70
核苷酸	毫克	1.18	25
乳铁蛋白	毫克	2.4	50
酪蛋白磷酸肽	毫克	2.0	43

100毫升奶液=13克奶粉+90毫升水



爱力优® 婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)



净含量: 400克
注册号: 国食注字 YP20170075

爱力优
婴儿配方奶粉
(0-6月龄, 1段)



特别提示

对于0-6月龄的婴儿, 最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

本产品应贮存于干燥凉爽处, 用后及时封严, 以保持新鲜, 防止吸潮或异物进入。请在保质期内食用, 开封后一个月内用完。

食用方法

冲泡时请用本产品专用量匙, 多于或少于指定份量的奶粉, 将令宝宝得不到适当的营养。未经煮沸消毒的水、饮奶器具或不适当的奶液浓度均可能引起不适。每次只冲调一次用量的奶液, 冲调好的奶液应尽快饮用, 未喝完的奶液不宜留存。

- 准备喂哺前将双手洗净。
- 将奶瓶、奶嘴及奶瓶环盖彻底洗净, 使用前用沸水煮不少于5分钟。
- 参照“喂哺表”, 将正确份量的温开水(50°C~60°C)加入到消毒后的奶瓶。
- 参照“喂哺表”, 用专用量匙加入正确数量的奶粉。
- 摇匀直至奶粉全部溶解, 将奶滴于手臂上, 确定已达到宝宝可饮用温度后, 即可喂哺。

生产商: 河北三元食品有限公司
地址: 河北省石家庄市新乐市三元路6号
产地: 河北省石家庄市
生产许可证编号: SC10513018400046



扫码
资讯
和
权益
更多



225.5mm

10mm

116.5mm

8mm



爱力优 婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)



1
净含量:150克
注册号:国食注字 YP20170075

营养成分表							
项目	单位	每100千焦	每100克	项目	单位	每100千焦	每100克
能量	千焦	100	2124	铜	毫克	14.7	313
蛋白质	克	0.52	11.0	镁	毫克	1.4	30
脂肪	克	1.28	27.2	铁	毫克	0.22	4.6
亚油酸 (ω-6)	毫克	0.19	4.0	锌	毫克	0.18	3.9
α-亚麻酸 (ω-3)	毫克	19	400	钙	毫克	1.98	42
碳水化合物	克	2.5	53.2	磷	毫克	15	320
维生素				钾	毫克	9	200
维生素A	微克视黄醇当量	17	360	钠	毫克	4.5	96
维生素D	微克	0.60	12.7	碘	毫克	16	350
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.40	8.5	硒	毫克	0.80	17.0
维生素K ₁	微克	1.27	27	膳食纤维	克	1.7	36
维生素B ₁	毫克	25	540	牛磺酸	毫克	0.3	7.0
维生素B ₂	毫克	38	800	左旋肉碱	毫克	4.4	94.5
维生素B ₆	毫克	21.0	445	二十二碳六烯酸(DHA)	毫克	4.9	105
维生素B ₁₂	微克	0.094	2.0	二十碳四烯酸(ARA)	毫克	4.9	105
烟酸(烟酰胺)	毫克	193	4100	膳食纤维	克	145	3080
叶酸	毫克	3.1	66	低聚半乳糖	毫克	9	200
泛酸	毫克	165	3500	多聚果糖	毫克	0.21	4.4
维生素C	毫克	2.8	60	1,3-二甘油-2-棕榈酸甘油二酯	克	3.3	70
生物素	微克	0.80	17	叶黄素	毫克	1.18	25
胆碱	毫克	6.1	130	核黄素	毫克	2.4	50
钙	毫克	7	150	乳铁蛋白	毫克	2.0	43
钾	毫克	18	382	酪蛋白磷酸肽	克	100	2100

100毫升奶液=13克奶粉+90毫升水

配料表	
生牛乳、乳糖、食用植物油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、脱盐乳清粉、二十二碳六烯酸油酸、矿物质(氯化钾、碳酸氢钠、磷酸氢钙、氯化钠、磷酸铁、硫酸亚铁、磷酸锌、磷酸铜、亚硒酸钠、硫酸锌)、花生四烯酸油酸、维生素(氯化胆碱、L-抗坏血酸、D-α-生育酚生育酚、D-泛酸钙、维生素B ₁₂ 、维生素B ₆ 、维生素C、维生素E、维生素K ₁ 、维生素B ₂ 、维生素B ₁)、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、果糖、叶黄素、植物甲萘醌、左旋肉碱、核黄素、泛酸、胆碱、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胸苷酸二核苷、5'-尿苷酸二核苷、5'-尿苷二核苷、5'-尿苷三核苷、5'-鸟苷酸二核苷)、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、叶黄素。本产品含有乳成分。	

☎ 咨询热线: 4006038099
🌐 网址: www.sanyuanbaobao.com



扫码了解更多
资讯和权益

爱力优 婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)



特别提示 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法 本产品应贮存于干燥凉爽处；用后及时封严，以保持新鲜，防止吸潮或异物进入。请在保质期内食用，开封后一个月内用完。

食用方法

请仔细阅读本产品专用量匙，多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。未经煮沸的水、饮料器具或不适当的奶次度均可能引起不适。每次只冲调一次用量的奶液，冲调好的奶液应尽快饮用，未喝完的奶液不宜留存。

- ① 准备喂奶前将双手洗净。
- ② 将奶瓶、奶嘴及奶勺灭菌彻底并洗净。使用前用沸水煮沸不少于5分钟。
- ③ 参照“喂哺表”，将正确份量的温开水(50℃-60℃)加入到消毒后的奶瓶。
- ④ 参照“喂哺表”，用专用量匙加入正确数量的奶粉。
- ⑤ 摇匀直至奶粉全部溶解，将奶瓶于手背上，确定已达到宝宝可饮用温度后，即可喂哺。

年龄	每次用量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉(平匙)	
0-2周	60	2	7-8
第3-4周	90	3	6-7
第2个月	120	4	6-6
第3个月	150	5	5-6
第4个月	180	6	5-6
第5-6个月	210	7	5

注: 本喂哺表参照正常发育婴儿的营养需求而设计, 您也可根据宝宝自身情况酌情增减使用量。

保质期: 24个月
生产日期及批号: 见罐底部
产品标准号: GB 10765-2021
产品类别、属性: 乳基粉状婴儿配方食品
检验合格证号同生产日期及批号
生产商: 河北三元食品有限公司
地址: 河北省石家庄市新乐市三元路6号
产地: 河北省石家庄市
生产许可证编号: SC10513018400046

